

NOTES SUR LES COLÉOPTÈRES TÉRÉDILES,

PAR M. P. LESNE.

---

21. DESCRIPTION D'UN *SINOXYLON* NOUVEAU  
DES ILES PHILIPPINES.

***Sinoxylon luzonicum* n. sp.**

*Long. circiter 5 mm.*

*S. bufoni* Lsn. *affine.*

*Corpus nigrum, abdomine rubro marginatum, femoribus tibiisque nigris, tarsisque rubro brunneis, antennis palpisque brunnescentibus. Antennarum articulus penultimus latitudine clavæ longitudinem superante, sed antennæ longitudinem haud attingente. Pronoti area postica granulis densis elongatis subcariniformibus ornata. Scutellum majusculum, inerme. Elytra fortiter denseque punctata ad ambitum declivitatis subcariosim vermiculatimque insculpta ibique granulata carinulisque nitidis 3 in singulo elytro instructa; truncatura apicali superne dense granulata, dentibus juxtasuturalibus haud contiguis neque compressis, crassis, basi granulatis, apice lævibus, obtusiusculis.*

Corps assez large, parallèle, d'un noir profond, à l'exception de l'abdomen qui est teinté de rouge sur les côtés et en arrière; cuisses et tibias noirs, les tarses d'un brun rougeâtre; antennes et palpes d'un roux brun.

Deuxième article de la massue antennaire plus large que celle-ci n'est longue, mais n'atteignant pas la longueur totale de l'antenne. Front brièvement quadridenté et n'offrant que quelques courtes soies dressées implantées suivant la rangée des dents. Yeux assez petits, bien détachés des tempes. Mandibules légèrement impressionnées à la base au côté dorso-externe. Côtés du prothorax très légèrement arqués, ses angles antérieurs armés chacun d'une dent non uncinée insérée au bord même; angles postérieurs subobtus faisant légèrement saillie en arrière. Déclivité antérieure du pronotum très densément râpeuse sur la totalité de son étendue et dès le bord antérieur, et n'offrant que quelques rares soies dressées; milieu de l'aire postérieure couvert de grains allongés. Écusson

relativement grand, non denté en avant. Élytres absolument glabres, marqués à leur base de points enfoncés arrondis, ces points épars dans la région scutellaire (où existe l'indication très nette d'une série juxtascutellaire), très denses dans la partie moyenne de la région basilaire de l'élytre. Calus huméral lisse et brillant. Bord basilaire cariniforme entre l'épaule et l'écusson. Dans la région moyenne de l'élytre, la ponctuation est plus forte et plus dense, et est partiellement confluyente; sur le tiers postérieur de la région cylindrique de l'élytre, la sculpture devient carieuse, vermiculée par places et elle admet, aux approches des bords de la déclivité apicale de nombreux grains sphériques perforés au sommet. Dans cette région, trois minces carènes brillantes subgranuleuses, peu accusées, représentent les tubercules normaux, mais elles ne sont nullement dentiformes à leur bout postérieur. La déclivité apicale n'est nullement coupée à angle vif. Sa sculpture comporte principalement des grains subsphériques perforés au sommet, très denses dans ses régions supérieures et latérales, assez écartés sur le tiers inférieur, et ménageant autour des dents juxtasuturales un espace libre, marqué seulement de quelques points fins enfoncés. Dents juxtasuturales situées au milieu de la hauteur de la déclivité, rapprochées de la suture mais nullement contiguës, courtes, épaisses, non comprimées, granuleuses à la base, lisses à l'apex, leur pointe assez obtuse, nullement acérée; bourrelet sutural granuleux irrégulièrement tuberculeux au-dessous du niveau des épines. Pas de côte oblique au bas de la déclivité. Épipleur médio-croisement large, légèrement et très graduellement élargi depuis l'angle sutural jusqu'au tournant externe.

Poitrine et abdomen couverts d'une pubescence dense, apprimée, d'un gris argenté. Tibias postérieurs avec quelques soies à demi dressées à leur face externe. Caractères sexuels inconnus.

Espèce apparentée au *Sinoxylon bufo* Lesne (1907) par son facies, sa sculpture et ses principaux caractères. Elle en diffère par l'écusson non denté, les dents frontales et les dents juxtasuturales beaucoup plus courtes, par les grains du milieu de l'aire postérieure du pronotum allongés et carinuliformes, par l'absence de saillies marginales tuberculiformes à la déclivité apicale, etc.

D'après ses caractères extérieurs, on doit la considérer comme une *forma præcursoria* de la très curieuse espèce bornéo-javanaise.

Deux exemplaires provenant de Luçon (Iles Philippines) m'ont été communiqués par M. F.-C. Hadden, de l'Agricultural College de Laguna. Ils ont été capturés au Mont Makiling par M. G.-C. Ladrera, les 26 décembre 1930 et 7 janvier 1931. L'un de ces exemplaires fait aujourd'hui partie des collections du Muséum.